

GINECOMASTIA

CIRUGÍA

Es un término médico utilizado para describir el agrandamiento anormal de la mama en el género masculino. Es una condición bastante común que afecta a casi la mitad de los hombres durante la adolescencia, y puede ocurrir en uno o ambos lados del pecho.

La ginecomastia puede ser resultado de cambios hormonales, pérdida de peso extrema, condiciones hereditarias, enfermedades o el uso de ciertas drogas. Se caracteriza por el exceso de tejido glandular, el exceso de grasa localizada o una combinación de ambos en el área de la mama, y en algunos casos, puede extenderse hacia los lados y la espalda también.

La cirugía de ginecomastia corrige el agrandamiento anómalo de las mamas del hombre. Este exceso de volumen en el pecho puede afectar tanto a una de las mamas como a ambas. Esta cirugía ayuda a los hombres a verse y sentirse mejor, creando un contorno torácico más masculino y acentuando los rasgos anatómicos del pectoral mayor para mostrar una región pectoral más atlética.

Cuándo plantear una cirugía de ginecomastia

Si después de un año tras la aparición de volumen excesivo en las mamas, el pecho no regresa a su estado normal por sí solo, se puede valorar el tratamiento quirúrgico.



GINECOMASTIA

CIRUGÍA

Cuidados Postoperatorios

- Tendrá que usar un chaleco durante dos a tres semanas para comprimir la piel y ayudar en el proceso de curación.
- Debe utilizar micropore para que no haya roce con los puntos o fricción directa de la herida con la vestimenta y a la vez proteger la herida.
- Los drenajes (si es necesario después de la cirugía) pueden ser eliminados después de uno o dos días. En algunas ocasiones, es posible ver pequeñas áreas con costras a lo largo de la línea de incisión, la cual debe mantenerse limpia. Estos no deben ser tocados y se caerán por sí mismos después de aproximadamente 15 días.
- La recuperación es rápida, pero es importante limitar la actividad física para una recuperación óptima. Se debe evitar cualquier ejercicio pesado, levantar, empujar o tirar pesos importantes de cuatro a seis semanas. El ejercicio fuerte puede obstaculizar el proceso de curación de las incisiones y dar lugar a complicaciones, tales como retraso en la cicatrización o cicatrices patológicas. La exposición directa a los rayos solares se debe evitar durante unos seis meses.



GINECOMASTIA

CIRUGÍA

La cita de valoración es de suma importancia, para analizar la mejor opción para usted, nuestro paciente. Dicha cita tiene un costo de 50.000 colones. El valor de la cirugía va desde los \$3290.

Incluye:

- Honorarios Medicos y Anestesiologo
- Citas Postoperatorias #5
- Prenda Postoperatoria
- Masajes post operatorios #5

¡Agradecemos su atención y preferencia de nuestros servicios!

